

DESCRIPTION D'UNE VARIÉTÉ NOUVELLE DU GOLIATHUS GIGANTEUS LAM.

Par ERNEST CSIKI.

(Avec une figure.)

Le Musée National Hongrois a reçu de M. ÉMILE TORDAY un grand mâle du *Goliathus giganteus* LAM., capturé dans le Congo belge aux environs du lac Moero ou Mérou. Cet exemplaire, 95 millim. de long, appartient à une variété nouvelle qui mérite un nom spécial.

KRAATZ a décrit et figuré dans la «*Deutsche Entomolog. Zeitschrift*» plusieurs variétés de cette espèce. Ces variétés sont :

- var. *albatus* KR. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1897. p. 250. et 1898. tab. 2. fig. 7.
- var. *apicalis* KR. l. c. 1895. p. 440.
- var. *confluens* KR. l. c. 1897. p. 250. et 1889. tab. 4. fig. 2.
- var. *conjunctivittis* KR. l. c. 1898. p. 13. tab. 2. fig. 1.
- var. *conspersus* KR. l. c. 1889. p. 377. tab. 4. fig. 1.
- var. *intermedius* KR. l. c. 1895. p. 438. fig. et 1897. p. 250.
- var. *interruptus* KR. l. c. 1897. p. 251.
- var. *longivittis* KR. l. c. 1898. p. 13. tab. 2. fig. 9.
- var. *marginatus* KR. l. c. 1889. p. 3. 378. tab. 4. fig. 4.
- var. *nigripes* KR. l. c. 1895. p. 440.
- var. *quadrimaculatus* KR. l. c. 1889. p. 379., 1895. p. 438. fig. et 1898. tab. 2. fig. 3.
- var. *undulatus* KR. l. c. 1897. p. 251. et 1898. tab. 2. fig. 6.

Notre exemplaire ne peut être rapporté à aucune de ces variétés ; il réunit plutôt les caractères de plusieurs variétés. Ainsi les dessins de son corselet ressemblent beaucoup à ceux de la var. *albatus* KR., mais ses élytres rappellent ceux des var. *conspersus* KR. et var. *apicalis* KR.

Les variétés décrites jusqu'à présent montrent dans le développement de la coloration blanche du corselet et des élytres un certain parallélisme. Le développement plus fort ou moins fort des dessins du corselet coïncide toujours avec un développement plus fort ou moins fort de ceux des élytres. Chez la variété nouvelle dont je donne ci-dessous la description, les dessins blancs du corselet sont bien développés tandis que ceux des élytres sont fort réduits.

Goliathus giganteus LAM. var. *connectens* n.

Corps d'un noir brunâtre velouté. Les deux bandes blanches externes du corselet sont réunies et forment une large bordure latérale en

renfermant dans la partie antérieure une tache striiforme de la couleur foncière; les trois bandes internes sont confluentes à la base (comme dans la *var. confluens* KR.); les trois bandes externes de chaque côté se réunissent au bord antérieur, ce n'est que la bande médiane qui y reste isolée. L'écusson est paré de deux bandes latérales et d'une bande médiane blanches. Les élytres présentent à la base une bande blanche irrégulièrement dentelée en arrière qui prend naissance au bord latéral devant le calus huméral et se continue le long de l'écusson jusqu'à la suture où elle se dissout dans une série de taches ponctiformes et disparaît bientôt. On peut considérer comme les dernières traces de cette série suturale les 2 ou 3 points blancs qui se trouvent dans la moitié apicale des élytres près de la suture. Le bord latéral des élytres est pourvu d'une série des petites taches blanches qui sont confluentes derrière le calus humeral et aussi vers l'extrémité en y aboutissant à une tache apicale plus élargie vers la suture. On remarque encore sur les élytres dans la région de l'écusson et près du bord latéral quelques très petits points blancs, bien visibles aussi sur la figure ci-jointe.



Goliathus giganteus LAM. var. *connectens* n.