

## VESPIDARUM SPECIES QUATTUOR NOVAE,

ab ALEXANDRO MOCSÁRY descriptæ.

1. *Jugurtia neotropica*.

Nigra, opaca, pleuris et abdomine subnitidis; mandibulis supra, apice rufonigroque excepto, labro clypeoque, antennarum scapo supra, macula didyma frontali minuta, aliaque reniformi utrinque ad sinum oculorum et longitudinali temporum, pronoto item margine antico sat late, macula sat magna mesopleurarum et minuta ante alarum tegulas, his antice posticeque et scutelli margine postico late, pallide flavis; antennarum scapo subtus et apice rufis; abdominis segmentis ventralibus: tribus primis rufis, primo utrinque macula minuta, secundo elongata sat magna, tertio fascia basali pallide flavis, hoc parte apicali infuscato, segmentis 4—7 nigris, 4—6 parte basali pallide flavo fasciatis, quarti fascia medio et lateribus dilatata, quinti utrinque anguste, sexti valde late interrupta maculamque medianam quadrangularem formante, septimo nigro, macula centrali minuta pallide flava, apice obtuso rufescenti; segmentis ventralibus: tribus primis rufis, tertio parte basali anguste nigro, reliquis nigris, ultimo apice macula centrali transversa minuta flava; pedibus rufis, femoribus anticis subtus triangulariter dilatatis nigris, externe subtus et intermediis antice ante apicem pallide flavo marginatis tibiisque omnibus supra albido tinctis; alis parum fumato-hyalinis, venis piceis, stigmatate sordide-flavo. — ♂; long. 9 mm.

Antennis minus longis, capite thoraceque simul sumptis parum brevioribus, apicem versus sensim incrassatis, sed non clavatis, articulis sat distinctis; clypeo apice medio angulatim, lateribus subarcuatim emarginato et irregulariter dense minus crasse punctato; fronte verticeque et thoracis dorso sat crasse punctato-subreticulatis interstitiisque subtilissime punctulatis, scutello mesopleuris que sat sparsim fortiter punctatis, metapleuris subtiliter coriario-rugosis et superne subtilissime transverse strigosis; abdominis segmentis dorsalibus: 1—6 fortiter minus dense, septimo subtiliter denseque punctatis, primi parte truncata sparsim subtilius punctata; segmento quarto ventrali dentissime punctulato, reliquis sat sparsim minus fortiter punctatis.

Paraguay: Asuncion, 1904. 16 XI, legit Á. VEZÉNYI hungarus. (Mus. Hung.)

2. *Celonites montanus*.

*Niger*, subnitidus, parce albo-pilosus; antennis rufis, articulis bene distinctis, duobus primis nigris, clava robusta, supra fortiter infuscata, subtus organis copuliformibus seu foveis tribus, articulo tertio sequentibus duobus simul sumptis longitudine æquali; clypeo macula magna centrali flava, ante apicem arcuato-emarginatum macula parva transversa et labro rufescenti-flavis; mandibulis basi nigris, apice rufescentibus; pronoto postice usque ad alarum tegulas anguste flavo-marginato et superne centro macula magna transversa, antice in medio parum emarginata aliaque minuta utrinque ad marginem anticum flavis ornato; alarum tegulis et segmenti mediani angulis posticis externis rufescenti-flavis; abdomine aurantiaco-flavo, ventre unicolore, sed segmentis dorsalibus: 1-6 parte basali late abbreviatim nigro-fasciatis, fasciis a margine laterali subferrugineo tincto longe remotis, postice in medio parum sinuatis, segmentis his insuper margine apicali fascia flava latiuscula ornatis, ano subferrugineo, ter emarginato, emarginatura centrali arcuata lata, lateralibus duabus minus profundis; pedibus flavis, femoribus parte basali late nigris; alis parum fumato-hyalinis, venis et stigmate piceis. ♂; long. 7 mm.

Clypeo dense punctato, fronte granulosa, thorace supra dense subreticulatim punctato, scutello longitudinaliter substriato, abdominis segmentis dorsalibus concinne dense sat crasse punctatis, ventralibus subnitidis, maxima parte basali sat sparsim punctulatis, parte apicali sublevibus, 5-6 apice in centro parum emarginatis.

Species: iam de colore et punctatura thoracis singulari facile cognoscitur.

Turkestan: Alai montes. (Mus. Hung.)

3. *Synagris basalis*.

Segmenti mediani dense subtiliter transverse striati lateribus subtus dente subacuto mediocri armatis, postscutello in medio lenissime emarginato: submagna ac robusta, ferruginea, antennis pedibusque concoloribus; fronte ac vertice temporibusque postice et mesonoto toto fusco-nigris, opacis, mesopleuris parum infuscatis; abdominis segmentis dorsalibus nigris, secundo fascia basali lata, parum plus quam dimidiam segmenti partem occupante et ad latera non extensa flava ornato, ventralibus nigris, primo ferrugineo; alis fusco-nigris, violaceo subnitentibus. ♀; long. 24 mm.

Clypeo convexo valde dense subtilissime punctato, punctis sparsis minutis, apice triangulariter producto obtusoque; mandibulis styliformibus multidenticulatis; fronte inter antennis acute carinata; vertice inter oculos lato, antennarum articulis duobus primis simul sumptis æquali, ocellis posterioribus inter se multo minus distantibus, quam ab oculis; mesonoto subtiliter coriario-rugoso irregulariterque sat sparsim crasse punctato; scutello canalicula tenui longitudinali instructo; abdominis segmentis dorsalibus dense aciculato-punctatis, ventralibus subnitidis sparsim punctulatis.

Species: de postscutello postice in medio lenissimo emarginato, fascia unica basali segmenti secundi flava alisque fusco-nigris, iam facile cognoscitur. — Fascia enim hæc in speciminibus omnibus aliis mihi cognitis generis *Synagris* apicalis et non basalis est.

Africa centralis: Uganda, specimen unicum. (Mus. Hung.)

#### 4. *Synagris ornata*.

Segmenti mediani dense crasseque transverse striati lateribus subtus dente subacuto mediocri armatis, postscutello postice in medio late emarginato lateribusque hoc modo obtuse denticulatis: magna, elongata, sat robusta, læte-ferruginea, antennis pedibusque concoloribus; fronte ac vertice temporibusque postice, pronoti lateribus superne, mesonoto cum scutello postscutelloque ex parte et abdominis segmentis (ventrali primo rufo excepto) nigris, subnitidis; antennis leviter infuscatis; macula didyma minuta frontali aliaque multo maiore elongata in pronoti lateribus anticis, minuta basali rotunda utrinque in scutello et postscutelli denticulis, alarum tegulis parte postica et maculis subovalibus abdominis sat magnis segmentis dorsalibus duobus primis ante marginem posticum utrinque pallide flavis seu eburneis; maculis lateralibus segmenti secundi fere duplo maioribus, quam primi; alis nigris, æneo-viridi micantibus parumque violascentibus. — ♀; long. 28 mm.

Clypeo valde convexo, sat crasse longitudinaliter rugoso, apice late rotundato; mandibulis styliformibus quadridentatis; fronte supra antennis acute carinata et supra maculas didymas impressa; vertice inter oculos proportionaliter minus lato, antennarum scapo longitudine æquali, ocellis posterioribus inter se longius distantibus, quam ab oculis; mesonoto subtiliter coriario, irregulariter sat sparsim fortiter punctato, disco spatio submagno impunctato; scutello valde sparsim, in medio crassius punctato et canalicula minus distincta instructo.

*Synagri amplissimae* KOHL statura et magnitudine alarumque colore similis; sed fronte thoraceque maculis eburneis ornatis et mesonoti disco spatio submagno inpunctato. — Colore et maculis etiam *Synagri aestuanti* FABR. similis; sed multo maior, clypeo, postscutello et segmento mediano penitus aliter constructis alisque aliter coloratis, bene distincta.

Africa centralis: Uganda, specimen unicum. (Mus. Hung.)

---