

ORTHOPTERA NOVA EXOTICA IN MUSEO NATIONALI
HUNGARICO ASSERVATA

descripsit DESID. KUTHY.

Eupromachus Mocsáryi n. sp. ♂ ♀.

Dilute-ferrugineus, vel rarius fuscus. Corpus granulis maioribus raris obsitum. Thorax tectiformis, depressus, carina subacuta usque ad abdomen perducta. Pronotum antice quadrispinosum. Femora et tibiæ mutica. Segmenta abdominalia supra ante apicem in medio obtuse denticulatim tuberculata.

Femina: corpore depresso, operculo lanceolato, carinato, apice emarginato, apicem segmenti analis non attingente.

Mas: corpore cylindriformi, segmento anali lobis dentiformibus. Lamina subgenitalis fornicata, apice rare granulosa, margine postico rotundata.

Long. corp.	♂ 52	mm ♀ 81	mm
“ meson.	“ 15	“ “ 19	“
“ met. c. s. m.	“ 4.05	“ “ 5	“
“ seg. m.	“ 3	“ “ 4	“
“ fem. ant.	“ 14	“ “ 18	“
“ fem. int.	“ 12	“ “ 16	“
“ fem. post.	“ 14	“ “ 18	“

Nova-Guinea: Ins. Cretin (BIRÓ).

Eupromacho acutangulo BRUNNER similis et affinis; sed major, magis dilute ferrugineus, segmentis abdominalibus supra ante apicem in medio tuberculis multo majoribus et operculo longiore, præsertim distinctus.

Biróëlla Bolivari n. sp. ♂.

Pallide testacea. Antennæ, articulis tribus primis exceptis, fuscæ. Fastigium verticis superne bifossulatum. Occiput medio carinula angusta instructum, utrinque callis nigris fastigium versus evanescentibus, lateribus nigro-maculatis. Elytra nigricantia, apice rotundata, venis pallide

fuscis. Femora postica carinulis tenuibus brunnescentibus, subtus pallide ciliata, apice late subcæruleo-annulata. Tibiæ apice parum dilutius annulatæ, superne pallide villosæ, spinis nigris. Abdomen fusco-nigrum, segmentis dorsalibus anticis margine apicali anguste pallide limbatis. Lamina supraanalis triangulariter elongata medioque impressa. Cerci erecti, sat longi, cylindrici, apice intus denticulis duobus parvis nigris armati.

Long. corp.	♂	17 mm
" pron.	"	3 "
" elytr.	"	4 "
" fem. post.	"	13 "

Nova-Guinea: Simbang (Biró).

Biróellæ dispari BOL. similis et affinis; sed colore magis pallido. pronoto concolore, femoribus apice latius annulatis, et præsertim cercis cylindricis, apice intus denticulis parvis nigris; non vero antecem intus sinuatis et dente unico acuto, pallido armatis, satis superque distincta.

Cephalocoema fusca n. sp. ♀.

Rostrum capite reliquo 1.05 longius, inter oculos et apice levissime arcuatum, supra subtusque canaliculatum, costis lateralibus superne fere usque ad oculos productis, canalicula infera profundiore per oculos tenuiter continuata, apice obtuse rotundatum. Femora antica lævia, postica carinata. Tibiæ posticæ superne margine interno 20-, margine externo 13-spinulosæ.

Long. corp.	♀	95 mm
" capit.	"	7 "
" rostri	"	10 "
" pron.	"	13 "
" fem. ant.	"	12 "
" fem. post.	"	26 "

Bolivia: Yungas de la Paz.

Species: forma capitis et rostri facillime cognoscenda.

Phlaeoba Horváthi n. sp. ♀.

Statura maxima. Colore fusco-testaceo, opaco. Fastigium verticis medioque carinula oculos haud superante instructa. Antennæ fulvidæ, capite pronotoque unitis longiores. Pronotum antice posticeque leviter

rotundatum, carinis tribus aequalibus instructum. infra carinas externas lineola longitudinali nigra. Elytra abdomine longiora. Linea sulphurea scapularis partem tertiam superans, areae discoidalis et ulnaris maculis irregulariter infuscatæ, area analis punctis biseriatis fusco-castaneis. Alæ hyalinæ, fusconigro-venosæ. Femora supra fortiter tricarinata, medio punctis fusco-castaneis irregulariter obsita. Tibiæ spinis apice nigris armatæ.

Long corp.	♀	68	mm
"	pron.	"	10 "
"	elytr.	"	55 "

Africa orientalis: Assab, Gibdo (ΚΑΤΟΝΔ).

Species: magnitudine egregia, in honorem illustris Hemipterologi Dr̄is G. HORVÁTH denominata.
