

DESCRIPTION OF A NEW FORMICARIAN-BIRD
FROM COLUMBIA.

By E. HELLMAYR and Dr. J. v. MADARÁSZ.

Grallaricula rara n. sp.

Above reddish-brown, more reddish on the front and face, and washed with olive on the rump; a patch before the eye blackish; chin, throat and side of body rusty-brown; middle of belly and under tail-coverts pure white; under wing-coverts rusty-brown. Bill dark horn-brown, the base of mandible and feet yellowish.

«Es handelt sich um eine gut charakterisierte neue Art der Gattung *Grallaricula*, die augenscheinlich mit der seltenen *G. ferrugineipectus* (von der mir ein Expl. des Tring Museums aus Ejido, W. Venezuela, das ich früher mit dem Typus in Paris verglichen habe, vorliegt) am nächsten verwandt ist. Sie unterscheidet sich aber leicht durch etwas bedeutendere Grösse (Flügel 69 statt 63—67, Schwanz 32 statt 30—31, Schnabel 14 statt $12\frac{1}{2}$ —13 mm), längeren sowie stärkeren Schnabel, viel dunklere (tief rostrotbraune statt blass ockergelbe) Kopfseiten, viel dunklere, mehr rostrote (statt ockergelbe) Kehle, Brust und Seiten, fast völligen Mangel des weissen Gurgelflecks, rostbraunen Oberkopf (bei *G. ferrugineipectus* ist auch die Stirn ein wenig rötlichgelb überlaufen, der übrige Oberkopf dagegen blass olivenbraun, wie der Rücken gefärbt), rostbraunen (statt blass olivenbraunen) Mantel, endlich durch viel dunkler rötlichbraune Schwingensäume.» (HELLMAYR in litt.)

The type in the Hungarian National Museum No. 3281/142 of this new species originating from Columbia (Dpt. Cundinamarca, Medina: Lanos) was secured in December 1912.
