

## Deux nouveaux Lamiaires du Congo-Belge (Coleoptera, Cerambycidae)

Par S. Breuning, Paris

### **Euryphrynet** n. gen.

Allongé, rammassé. Antennes épaisses, un peu moins longues que le corps, les cinq premiers articles frangés en dessous de poils très courts: le scape long, légèrement grosse de la base à l'extrémité, le troisième article à peine aussi long que le quatrième, beaucoup moins long que le scape, le quatrième un peu plus long qu'un des articles suivants. Tubercules antennifères distants et peu sail-lants. Yeux grossièrement fazettés et fortement échancrés, les lobes inférieurs très grands. Lèvre supérieure garnie de nombreux cils dressés. Front plus haut que large. Pronotum transverse, convexe, grossièrement et irrégulièrement ridé, pourvu de quatre sillons transversaux, deux antérieurs et deux postérieurs, le deuxième antérieur et le premier postérieur ondulés, ainsi que d'une longue épi-ne latérale conique mince et très pointue, dirigée obliquement vers le haut. Élytres allongés, convexes, sensiblement plus larges que le pronotum à sa plus grande largeur, parallèles dans les trois quarts antérieurs, largement arrondis au sommet (l'angle sutural bien accusé). Tête retractile. Saillie prosternale tron-quée verticalement à son bord postérieur. Saillie mésosternale arrondie et tron-quée à son bord antérieur. Métasternum de longueur normale. Cavités cotyloïdes intermédiaires ouvertes. Pattes de longueur moyenne, robustes. Fémurs clavi-formes. Tibias intermédiaires sans sillon dorsal. Crochets divariqués.

Type : *albotriangularis* Breun.

Ce genre appartient à la tribu des *Phrynetini* Thoms. et se rapproche le plus du genre *Homelix* Thoms. Il s'en distingue surtout par la longueur du troisi-ème article des antennes qui est très inférieure à celle du scape.

### **Euryphrynet** *albotriangularis* n. sp.

Lobes inférieurs des yeux plus de quatre fois plus longs que les joues. Front beaucoup moins large qu'un de ces lobes. Élytres grossièrement ponctués sur le premier tiers, finement ponctués sur le deuxième tiers.

Noir, couvert du pubescence brun rougeâtre. Ecusson avec deux petites taches latérales blanches. Élytres ornés d'une étroite tache triangulaire post-scutellaire blanche. En plus, sur chaque élytre une grande tache semicirculaire latérale prémédiane brun foncé, bordée de pubescence blanchâtre dans sa moitié postérieure, et une très étroite bande brun foncé qui part du milieu de la base

très obliquement vers la suture en longeant la tache postscutellaire et après avoir touché la suture se dirige obliquement vers la marge externe qu'elle atteint un peu après le milieu.

Longueur : 27 mm ; largeur : 11 mm.

Type : une ♀ du Congo belge : Kangu-Mayombe, coll. Dr. Peregi.

***Phosphorus angolator* Ol. m. *postconjuncta* nova**

Comme la forme typique, mais la deuxième bande transversale jaune de l'élytre est beaucoup plus large, deux fois plus large que la bande transversale postmédiane noire et reliée à la petite tache postmédiane subsuturale jaune.

Type : une ♀ du Congo belge : Kangu-Mayombe, coll. Dr. Peregi.

**Két új Lamiina Belga-Kongóból (Coleoptera, Cerambycidae)**

Irta : S. Breuning, Páris

A szerző a Természettudományi Múzeum meghatározatlan afrikai Lamiina-anyagában 2 új formát talált, amelyek közül az egyik a *Phosphorus angolator* Ol. érdekes színváltozata, a másik pedig egy eddig ismeretlen új nem új faja, amelyet *Euryphrynetta albotriangularis* néven vezet be az irodalomba. Mindkét új formából csak egy-egy példány ismeretes, s ezek típusa a Természettudományi Múzeum gyűjteményében van.