

Nouveaux Coléoptères de diverses familles

Par M. PIC, Les Guerreux

En 1902, c'est à dire il a plus de cinquante ans, j'ai décrit quelques Coléoptères rentrant seulement dans les Micros Hétéromères (*Hylophilidae* ou *Aderidae*, *Anthicidae*), recueillis par le grand voyageur naturaliste hongrois Biró. Aujourd'hui, les communications (pour les chasses du même récolteur) fautes par le s Musées National Hongrois sont bien plus variées et s'étendent à un plus grand nombre de familles, parmi les Clavicernes, Helodidae, Ptinidae et voisins, Hétéromères divers.

Les types uniques de ce mémoire, comme par le passé, sont à Budapest et je possède, suivant le nombre, un ou plusieurs paratypes des formes recueillies en plusieurs exemplaires, indications qui seront données avec les descriptions.

Avant d'aborder les descriptions, je dois d'abord m'excuser de n'avoir pas pu nommer tout ce qui m'a été envoyé et cela pour diverses raisons. Le manque de descriptions pour la faune australienne, des spécimens peu tranchés ou mal préparés pour une étude sérieuse, ou complète, des défraîchis et certains micros que ma vue, très affaiblie, ne me permet plus de pouvoir identifier avec certitude, comme par le passé. Une autre restriction à mon mémoire est faite pour les *Scaphidiidae* plus ou moins microscopiques dont ici je ne mentionnerai que quelques formes tranchées, réservant (pour un article spécial ultérieur me laissant une plus longue période d'étude) la plus grande partie de l'ensemble communiqué et comprenant de nombreuses espèces nommées in litteris par feu C. S. I. K. et qu'il convient de ne pas travailler trop vite, avec l'esprit libre d'autres soucis.

L'étude des insectes communiqués (pour faciliter la consultation spécialisée) sera répartie dans trois divisions. La première groupera les Clavicernes, divers, la 2^eme, sous le titre de : petites familles diverses, réunira les Hélodidae, Cisidae, Anobiidae et Ptinidae. Enfin, la 3^eme sera réservée aux seuls Hétéromères (non Melasomes, ni vésicants) de nombreuses familles.

I. Clavicernes divers

Heteroscapha Birói n. sp. (*Scaphidiidae*)

Ovoïforme, très brillant, roux-brunâtre avec membres testacés. Yeux grands, argentés. Thorax long, rétréci en avant, sans ponctuation appréciable. Elytres subarqués, un peu atténus à l'extrémité, tronqués au sommet, à strie présuturale nette et sans ponctuation appréciable, souff avant le sommet. Long. 2—2,5 mm.

N^elle Guinée : Stephansort, Astrolabe Bay. Vu deux ex. paratype dans ma collection.

Espèce particulièrement caractérisée par ses élytres presque imponctués. Peut se placer près *deminutum* Ach.

Heteroscapha basicolle n. sp. (*Scaphidiidae*)

Ovoïforme, très brillant roux-testacé, thorax ayant une étroite bordure basale foncée. Yeux grands, argentés. Thorax long, retréci en avant sans ponctuation appréciable. Elytres subarqués, un peu atténus à l'extrémité, tronqués au sommet, à strie présuturale nette et sans ponctuation bien marquée. Long. 2 mm environ.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Unique.

Espèce voisine de la précédente, reconnaissable entre toutes par sa particulière coloration et surtout son thorax roux bordé postérieurement de noir.

Amalocera quadripunctata Csiki in litt. (*Scaphidiidae*)

Large, oblong subovalaire, noir de poix ou teinté un peu de roussâtre. Elytres ayant des macules transversales jaunes antérieures et postérieures, sommet du pygidium et membres testacés. Tête petite, plus étroite que le thorax. Thorax assez court et large, un peu retréci en avant, sans ponctuation appréciable. Elytres à peu près de la largeur du thorax, subarqués sur le côtés, largement tronqués au sommet, à strie présuturale nette avec quelques points isolés, de coloration foncés, parfois à bordure rousse à l'apex, ayant sur chacun deux macules transversales jaunes, l'antérieure plus courte près de la base, l'autre avant le sommet et subfasciée. Long. 2—2,5 mm.

N^elle Guinée : Erima, Astrolabe Bay ; Sattelberg, Huon Golf ; Friedrich-Wilhelmshafen. Petite série et paratypes dans ma collection.

Espèce décrite sous le nom donné par Csiki, mais le genre est douteux. L'espèce ressemble à *Pseudoscaphosoma subelongatum* Pic.

Scaphosoma unifasciatum n. sp. (*Scaphidiidae*)

Relativement grand, oblong allongé, brillant, noir, parfois en partie teinté de roussâtre, élytres ayant sur chacun une macule transversale jaune avant le sommet. Pygidium et membres testacés. Tête peu plus étroite que le thorax. Thorax assez court et large, retréci en avant, peu ponctué. Élytres à peu près de la largeur du thorax, subarqués latéralement, largement foncés au sommet, à strie présuturale nette et ayant antérieurement de gros points diversement disposés. Long. 2,5—3 mm.

N^elle Guinée : Sattelberg. Huon Golf. Petite serie, paratypes dans ma collection.

Espèce de coloration particulière et ayant une macule jaune de moins aux élytres que la précédente espèce. Peut se placer près de *perforatum* Pic.

Scaphosoma fasciatum n. sp. (*Scaphidiidae*)

Petit, subovalaire, convexe, brillant, variable de coloration, d'ordinaire différemment roux ou rembruni par places avec des dessins plus foncés sur les élytres ; membres testacés. Thorax sans ponctuation appréciable. Elytres à strie présuturale nette et points divers irrégulières, de coloration variable ayant,

soit une fascie prémédiaire foncée ou d'un brun roussâtre avec une bande apicale de couleur foncée (*forma typica*), soit avec la macule apicale oblitérée (var. n. **Birói**). Long. 1—1,5 mm.

N^elle Guinée et diverses localités. Grande série et plusieurs paratypes dans ma collection.

Peut se placer près de *luteoapicale* Pic, du Tonkin, mais coloration tout autre.

Scaphosoma birónis Csiki in litt. (*Scaphidiidae*)

Petit, oblong-subovalaire, brillant, foncé, noir de poix ou en partie un peu roussâtre apex des élytres bordé ou de noir ou de roux, pygidium plus ou moins et membres testacés, antennes un peu obscurcies à l'extrémité. Thorax court et large, un peu rétréci en avant, non sensiblement ponctué. Elytres à strie présuturale nette, plus ou moins fortement et irrégulièrement ponctués. Long. 1,5 mm environ.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Vu 3 exemplaires dont 1 paratype dans ma collection.

Se rapproche un peu de *tonkineum* Pic près duquel on peut le placer.

Toxidium ornatum Csiki in litt. (*Scaphidiidae*)

Petit, peu comprimé, atténue postérieurement, brillant, roux testacé ; élytres à bande basale et apicale noires. Membres testacés, antennes un peu obscurcies à l'extrémité. Thorax peu court, rétréci en avant, sans ponctuation marquée. Elytres assez courts, atténués postérieurement, finement et irrégulièrement ponctués. Long. 1 mm environ.

N^elle Guinée : Stephansort, Astrolabe Bay. Unique.

Par sa coloration se rapproche de *cinctum* Pic, mais ayant une toute autre forme, surtout bien moins allongé, thorax plus large et plus court.

Toxidium Birói Csiki in litt. (*Scaphidiidae*)

Petit, peu comprimé, très atténue postérieurement, brillant, roux testacé, unicolor, membres testacés. Long. 1 mm environ.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Unique.

Voisin du précédent par sa forme, mais plus fortement atténue postérieurement et étyres dépourvus de bandes foncées.

Chelonarium Birói n. sp. (*Dryopidae*)

Oblong-allongé, atténue aux deux extrémités, un peu brillant à pubescence grise non dense avec des mouchetures pileuses blanches irrégulièrement disposées sur les élytres ayant une coloration générale roussâtre, pattes claires. Thorax court et large, subarqué en avant, creusé en arc antérieurement et relevé sur les bords, un peu moins large que les élytres, à ponctuation granuleuse assez

forte et rapproché, muni d'une petite impression postérieure devant l'écusson. Ecusson large, peu pubescent. Elytres assez longs, subarqués sur les côtés, atténus à l'extrémité, un peu bombés et modérément impressionnés sur la base, à ponctuation granuleuse fine et dense. Long. 5 mm.

Singapore (1897). Unique.

Se rapproche de *tonkineum* v. *rufipenne* Pic, s'en distingue par l'écusson plus parge, peu pubescent, le thorax plus transversal, les élytres moins impressionnés sur la base et aussi dépourvus d'une impression transversale prescutellaire.

Limnichus Birói n. sp. (Byrrhidae)

Subovalaire, très convexe, brillant, revêtu d'une fine pubescence grise rapprochée, laissant souvent aux élytres des parties dénudées non régulières, d'une coloration générale noire à reflets un peu métalliques. Tête plus étroite que le thorax ; yeux petits, très écartés. Thorax court, large, un peu rétréci en avant, plus étroit que les élytres, convexe finement ponctué. Elytres courts, subarqués sur les côtés, atténus à l'extrémité, très bombés près de la base, finement ponctués. La var. nouv. *incertus*, à les élytres moins bombés avec la pubescence noir dense et plus uniformément disposée. Long. 1—1,5 mm.

N^elle Guinée : Stephansort, Astrolabe Bay. Petite série dont plusieurs paratypes dans ma collection.

A placer près de *diversus* Pic, ce genre n'était pas encore signalé de la Nouvelle-Guinée, de même que le suivant.

Cyphoniscus neoguineensis n. sp. (Byrrhidae)

Oblong-subovalaire, convexe, brillant, à longue pubescence grise couchée non dense, de coloration générale roussâtre avec les élytres un peu obscurcis sur la suture avant le milieu. Tête plus étroite que le thorax, yeux grands, séparés. Thorax court et large, un peu rétréci en avant, peu nettement et finement ponctué. Elytres peu longs, très atténus postérieurement, très bombés antérieurement, un peu comprimés sur les côtés antérieures, finement et éparsément ponctués. Long. 2—3 mm.

N^elle Guinée : Stephansort, Astrolabe Bay. Unique.

Diffère de *rufescens* Pic, de Bornéo, par les élytres dont le bord externe, avant le milieu, est nettement élargi en lobe tandis que ces organes sont moins longs et moins nettement ponctués.

Cyphoniscus grandis n. sp. (Byrrhidae)

Large, subovalaire, brillant, à pubescence longue et grise, non dense, un peu luisante, de coloration générale roussâtre rembrunis avec les antennes jaunes. Tête plus étroite que le thorax, yeux moyens, écartés, antennes courtes, à derniers articles un peu élargis. Thorax court et large, rétréci en avant : un peu déprimé en-dessus, diversement ponctué. Elytres un peu plus larges que le thorax, subarqués sur les côtés très atténus postérieurement, gibbosité

latérale, nette, à ponctuation assez forte et rapprochée. Long. 3,5 mm.

Nelle Guinée : Tigidu, Huon Golf. Unique.

Très distinct du précédent par sa taille plus avantageuse, la ponctuation plus forte, les élytres un peu plus longs (vus de profil), non régulièrement déclives à l'extrémité.

Byrrhinus neoguineensis n. sp. (*Byrrhidae*)

Subovalaire, un peu convexe, brillant, à longue pubescence grise, de coloration roussâtre, parfois rembrunie en partie, membres testacés. Tête à ponctuation fine et rapproché, yeux assez petits, distants. Thorax court et large, rétréci en avant, sinué postérieurement, à ponctuation fine et rapprochée. Elytres à la base, pas plus larges que le thorax et échancrés de chaque côté, plutôt courts, subarqués sur les côtés, atténus à l'extrémité, à ponctuation diverse, fine et mêlée de gros points, ceux-ci en partie disposés en rangées longitudinales. Long. 3 mm.

Nelle Guinée : Erima, Stephansort, Astrolabe Bay. Paratype dans ma collection.

Se rapproche de *subtestaceus* Pic, de Manille, en diffère par les antennes entièrement claires, la forme plus large des élytres la ponctuation plus fine du thorax. Genre nouveau pour la Nouvelle-Guinée.

Byrrhinus nitidicollis n. sp. (*Byrrhidae*)

Oblong, un peu convexe, très brillant, à longue pubescence un peu fauve ou grisâtre, de coloration générale noire ; antennes testacées, pattes en partie roussâtres. Tête plus étroite que le thorax, finement ponctuée, yeux gris, allongés et distants. Thorax court et large, un peu rétréci en avant, fortement sillonné postérieurement, très finement ponctué. Elytres un peu plus larges que le thorax, relativement longs et atténus postérieurement, fortement entaillés sur chacun et impressionnés à la base, à ponctuation diversement fine, entremêlée de gros points en partie disposés en ragnées antérieurement, mais postérieurement à ponctuation simplement fine. Long. 0,5 mm environ.

Nelle Guinée : Erima, Astrolabe Bay. Unique.

Par sa coloration foncée se rapproche de *Boucardi*, Pic, de Sumatra, mais le thorax est très finement ponctué, la forme du corps plus allongée.

Byrrhinus Birói n. sp. (*Byrrhidae*)

Petit, oblong-subovalaire ou un peu suballongé brillant, un peu convexe, à pubescence grise espacée, parfois un peu hirsute, d'ordinaire rouge avec des élytres obscurcis antérieurement et plus moins éclaircis à l'extrémité, les élytres parfois largement roux ; membres testacés. Tête plus étroite que le thorax, finement ponctuée, yeux écartés. Thorax court et larges, rétréci en avant, sinué postérieurement, à ponctuation fine et un peu rapprochée, à peu près de la largeur des élytres. Elytres peu longs, d'ordinaire un peu subarqués sur les côtés, atténus à l'extrémité, ayant peu de points fins mais de nombreux gros points en partie alignés avec l'extrémité seulement finement ponctuée. Long. 1,5 mm.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen ; Erima, Astrola Bay. Plusieurs paratypes dans ma collection.

Espèce caractérisée par sa petite taille jointe aux très nombreux gros points des élytres.

Orphinus convexus n. sp. (Dermestidae)

Subovalaire, très convexe, brillant, à longue pubescence grise espacée, de coloration roussâtre, rembrunie par places, les élytres étant foncés à la base et largement roux au sommet ; abdomen, avec les membres testacés, yeux blancs, saillants. Thorax court et large, un peu rétréci en avant, plus étroits que les élytres, à ponctuation fine, écartée. Elytres courts, un peu arqués sur les côtés, atténus, à l'extrémité, à ponctuation fine, écartée. Elytres courts, un peu arqués sur les côtés, atténus à l'extrémité, à ponctuation fine et peu serrée. Long. 2 mm environ.

Singapore, 1897. Unique.

Se rapproche de *infasciatus* Pic, de Luzon, mais élytres plus fortement ponctués et plus convexes avec l'abdomen plus clair.

Orphinus Birói n. sp. (Dermestidae)

Oblong-subovalaire, un peu brillant, orné d'une longue pubescence grise, de coloration noire, élytres avec une bande médiane rougeâtre n'atteignant pas la suture sur chaque étui et une grande macule apicale de même coloration. Membres testacés. Thorax assez court et large, rétréci en avant, à ponctuation assez fine et écartée. Elytres un peu plus larges que le thorax, subarqués sur les côtés, un peu atténus à l'extrémité, à ponctuation peu fine et un peu écartée (*forma typica*), ou plus fortement ponctués avec la fascie élytrale oblitérée (var. nouv. *seminotatus*). Long. 1,5—2 mm.

N^elle Guinée : Erima, Astrolabe Bay. Un Paratype de la forme typique dans ma collection.

Distinct, à première vue, de *testaceipes* Pic par les élytres noirs nettement fasciés de rouge, au moins à macule apicale très distincte de cette coloration

II. Petites familles diverses

Cis neoguineensis n. sp. (Cisidae)*

Oblong, un peu robuste, très convexe, faiblement brillant, peu pubescent, de coloration générale rousse ou testacée, membres clairs. Tête robuste, de la largeur du thorax. Antennes indistinctes. Thorax long, un peu rétréci en avant, à peu près de la largeur des élytres, à ponctuation fine, peu écartée. Elytres courts, brièvement réfrécis au sommet, à ponctuation un peu forte et rapprochée, en partie régulière. Long. 1 mm environ.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Un paratype dans ma collection.

*Les antennes étant cachées ou peu visibles je ne suis pas certain d'avoir classé le Cisidae dans leur genre véritable.

Cette espèce n'a rien de bien particulier mais je la décris parce qu'il n'est pas de Ciside signalé en Nouvelle-Guinée et aussi parce que j'en ai vu plusieurs exemplaires.

Cis flavonotatus n. sp. (*Cisidae*)

Oblong-allongé, brillant, orné d'une pubescence grise, noir de poix avec les membres testacés, les élytres étant ornés chacun d'une large fascie pré-basale et d'une grosse macule apicale flaves. Antennes paraissant avoir 10 articles avec une massue de trois. Thorax assez court, un peu plus large que la tête et plus étroit que les élytres, fortement ponctué. Elytres assez longs, atténus à l'extrémité, à ponctuation irrégulière, un peu forte. Long. 1 mm environ.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Espèce très caractérisée dans la famille par les élytres largement ornés de dessins flaves.

Ennearthron Birói n. sp. (*Cisidae*)

Petit, oblong, brillant, à pubescence grise fine, de coloration rousse avec les membres testacés. Tête ornée de deux cornes plus ou moins larges et triangulaires, antennes paraissant avoir 9 articles et la massue 3. Thorax court et large, peu plus large que la tête et à peu près de la largeur des élytres, à ponctuation fine et écartée. Elytres assez courts, atténus à l'extrémité, à ponctuation un peu forte et rapprochée. Long. 1 mm environ.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf ; Friedrich-Wilhelmshafen. Un paratypes dans ma collection.

Se rapproche un peu de *castaneipenne* Mellié, de Cuba, avec les cornes plus accentuées et une coloration plus claire.

Trichodesma multifasciculata n. sp. (*Anobiidae*)

Assez court et large, opaque, assez densément pubescent de jaunâtre avec quelques parties dénudées foncées, de coloration obscure avec la tête et les membres roussâtres, orné de longs poils obscurs dressés, les élytres ayant, en surplus, plusieurs fascicules pileux ou dents foncées, disposés sur plusieurs rangées, en outre, de granules plus ou moins fortes et qui se retrouvent aussi sur le thorax. Thorax transversal, très inégal en dessus, échancré en avant, rétréci postérieurement, surélevé en gibbosité au milieu et muni d'une dent postérieure surélevée ainsi qu'un peu arquée. Long 5 mm.

Singapore, 1898. Unique.

Espèce très caractérisée par les multiples fascicules ou dents ornant les élytres conjointement avec la dent du thorax très surélevée.

Theca Birónia n. sp. (*Anobiidae*)

Oblong, atténus aux deux extrémités, convexe, à pubescence blanche en partie dénudée par frottement, peu brillant, roux, membres testacés. Tête très penchée, yeux gris, peu saillants. Thorax court et large, rétréci en avant,

à ponctuation fine et rapprochée. Elytres peu plus larges que le thorax, peu longs, atténués à l'extrémité, modérément striés, ponctués avec les intervalles assez larges et ponctués. Long. 3,5 mm.

Singapore, 1898. Unique.

Diffère de *multistriata* Pic par la coloration claire et la forme moins raccourcie.

Theca simbangana n. sp. (*Anobiidae*)

Petit, court, convexe, subopaque, brillant, hirsute, noir de poix avec la tête (antennes cachées) rousse ; pattes testacées. Tête très inclinée. Thorax bombé, assez court, rétréci en avant, descendant sur les côtés postérieurs, en dessous des élytres, finement ponctué. Elytres courts et larges, atténués à l'extrémité, ayant les épaules, fortement striées-ponctuées. Long. 1 mm environ.

N^elle Guinée : Simbang, Huon Golf. Unique.

Espèce très caractérisée par sa petite taille jointe à sa forme trapue avec la tête plus claire que le reste du corps.

? **Mesotheca Birói** n. sp. (*Anobiidae*)

Oblong, plus atténué en avant qu'en arrière, à longue pubescence grise peu brillant, dessus roussâtre avec les élytres en partie obscurcis. Antennes cachées ; pattes testacées. Tête un peu infléchie en dessous du thorax. Thorax court et large, rétréci en avant, descendant peu en arrière, au dessous des élytres, un peu plus étroit que les élytres, finement et densément ponctué. Elytres peu longs, atténués postérieurement, seulement striés ponctués sur les côtés en dessus, à ponctuation irrégulière, peu fine et dense, ayant les épaules bien marquées. Long. 1 mm environ.

Australie : Victoria, 1900. Unique.

Par sa forme, mimant *Theca* M. R. mais avec les élytres seulement striés latéralement, je crois devoir classer cette espèce dans le genre *Mesotheca* Scott, non signalé en Australie, sans être absolument certain qu'elle est bien classée.

Ptilinus bituberculatus n. sp. (*Anobiidae*)

Allongé, subparallèle, presque opaque, à fine pubescence grise, de coloration rousse, antennes testacées, celles-ci grêles, longuement flabellées. Tête large, à peu près de la largeur du thorax ; yeux grands, gris. Thorax court et large, ayant, de chaque côté sur son milieu, un petit tubercule surélevé avec une faible carène médiane raccourcie, transversalement sillonné antérieurement, densément ponctué. Elytres peu plus larges que le thorax, longs, atténués à l'extrémité, faiblement striés ponctués avec les intervalles étroits. Long. 4 mm.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Vu deux exemplaires dont un paratype mutilé dans ma collection.

Espèce très caractérisée par son thorax bitubercule, mime *Oligomerus longicornis* Pic, de Chine, avec des antennes différentes.

Ptinus Birói (Ptinidae)

Court et large, très brillant, orné de quelques longs poils dressés, noir, élytres à reflets métalliques, un peu cuivreux, ayant une petite macule blanche derrière chaque épaule. Membres foncés, cuisses un peu rougeâtres. Tête petite, creusée au milieu, yeux saillants ; antennes noires, claires à l'extrémité, subfiliformes, à premier article épais. Thorax peu long, fortement étranglé latéralement près du milieu, bombé et presque lisse sur la partie médiane, à sillon transversal antérieur, déprimé postérieurement avec quelques gros points. Elytres larges et courts, épaules surélevées, ayant plusieurs impressions près de la base, en partie striés-ponctués. Pattes foncées avec les cuisses roussâtres. Long. 2 mm.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Espèces très caractérisée par sa sculpture et sa coloration élytrale. Peut se placer près de *neoguineensis* Pic.

Ptinus Kaszabi n. sp. (Ptinidae)

Oblong, avec les élytres larges, très brillant, dessous densément pubescent de blanc, dessus orné de longs poils blancs non denses avec de longs poils dressés, noir, dessus à faibles reflets métalliques. Tête assez large. Yeux petits. Antennes foncées, grêles. Thorax peu long, un peu étranglé et sillonné près de la base, à impression transversale antérieure, ayant quelques gros points. Elytres bien plus larges que le thorax, peu longs, atténus à l'extrémité, un peu impressionnés près de la base, ayant les épaules un peu marquées, faiblement striés-ponctués. Pattes grêles, rousses, cuisses marquées de noir. Long. 2 mm environ.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Voisin de *Dohertyi* Pic, avec le thorax moins élargi en avant, les élytres très pubescents de clair avec des reflets un peu métalliques.

Biróguineus n. gen. (Helodidae)

Oblong-allongé. Antennes insérées devant les yeux et rapprochées l'une de l'autre ; thorax plus étroits que les élytres. Toutes les pattes robustes avec les cuisses un peu épaissies.

Ce genre nouveau établi sur les caractères combinés ci-dessus et créé pour l'espèce nouvelle suivante, peut se placer près de *Macrociphon* Pic.

Biróguineus fortipes n. sp. (Helodidae)

Oblong-allongé, assez convexe, brillant, à pubescence grise, un peu luisante, avec des poils redressés, de coloration roussâtre avec le thorax, l'écusson et les élytres de coloration plus claire. Antennes foncées avec les premiers articles testacés les 2 et 3 étant courts, le 2 plus large que le 3 les suivants foncés, étroits et longs. Tête à peu près de la largeur du thorax, yeux gris, petits, très écartés. Thorax court et large, un peu rétréci en avant, nettement rebordé latéralement, non surélevé en avant au-dessus de la tête fortement ponctué.

Ecusson petit. Elytres plus larges que le thorax, à épaules arrondies, longs, atténues à l'extrémité, à ponctuation forts, s'effaçant vers l'extrémité, irrégulière et rapprochée, ayant une impression suturale derrière l'écusson et une trace de strie présuturale sur chaque étui. Long. 2,5 mm environ.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Scirtes singaporensis n. sp. (*Helodidae*)

Subovalaire, peu convexe, pubescent de gris, assez brillant, roux avec les élytres plus clairs, jaunâtres. Tête large, finement ponctuée, yeux gris, écartés; antennes testacées. Thorax court et large, rétréci en avant, à ponctuation fine, non rapprochée. Ecusson densément ponctué. Elytres subarqués sur les côtés, atténues à l'extrémité, étroitement rebordés, à ponctuation irrégulière, fine, rapprochée. Pattes rousses. Long. 2,5 mm.

Singapore, 1897. Paratype dans ma collection.

Se rapproche de *bicoloricornis* Pic en s'en distiguant, à première vue, par ses antennes entièrement claires.

Scirtes Birói n. sp. (*Helodidae*)

Oblong-allongé, très atténue à l'extrémité, un peu convexe, brillant, à pubescence grise, coloration d'un roux testacé. Thorax court et large, rétréci en avant, à ponctuation peu fine et rapprochée. Ecusson plutôt densément ponctué. Elytres un peu longs, arqués sur les côtés, très atténues à l'extrémité, assez étroitement rebordés, à ponctuation irrégulière, pas fine et rapprochée. Pattes rousses, cuisses postérieures rembrunies au sommet. Long. 3,5 mm.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Plus grand et moins court que le précédent avec ses cuisses postérieures marquées de brun à leur sommet.

Scirtes astrolabensis n. sp. (*Helodidae*)

Subovalaire, un peu convexe, brillant, pubescent de gris, de coloration roussâtre presque uniforme, plus claire en dessous et sur les membres. Tête large, un peu plus claire en avant, densément ponctuée, yeux gris, écartés; antennes claires. Thorax court et large, rétréci en avant, à ponctuation un peu forte et rapprochée. Ecusson densément ponctué. Elytres subarqués sur les côtés, atténues à l'extrémité, assez étroitement rebordés, à ponctuation plus forte ou plus nette que d'ordinaire avec, sur chaque étui, une strie présuturale distincte. Long. 2,5 mm.

N^elle Guinée : Astrolabe Bay, Erima. Paratype dans ma collection.

Parait voisin de *nigricans* Wat., moins foncé avec une ponctuation plus nette et plus forte.

Scirtes brisbanensis n. sp. (*Helodidae*)

Oblong-allongé, brillant, un peu convexe, pubescent de gris, roux, un peu rembruni par places, élytres d'un jaune flave rembrunis sur les côtés antérieurs et plus longuement sur la suture étroitement bordée de brun au sommet. Tête large, finement ponctuée, yeux noirs, écartés, antennes noires, à base testacée. Thorax court et large, rétréci en avant, finement et peu densément ponctué. Écussion densément ponctué. Elytres subarqués sur les côtés, atténus à l'extrémité, étroitement rebordés, à ponctuation fine et un peu rapprochée. Pattes testacées. Long. 2,3 mm.

Australie : Quensland, Brisbane. Unique.

Espèce caractérisée par sa particulière coloration élytrale.

Scirtes neoguineensis n. sp. (*Helodidae*)

Grand, oblong-subovalaire, peu convexe, très brillant, pubescent de gris, de coloration générale roussâtre avec les membres plus clairs. Tête large, finement ponctuée, yeux foncés, écartés ; antennes testacées. Thorax court et large, rétréci en avant, à ponctuation fine, peu rapprochée. Écussion grand, peu densément ponctué. Elytres peu longs, subarqués sur les côtés, atténus à l'extrémité, à rebord peu large, ponctuation irrégulière, peu fine et un peu écartée. Pattes testacées, les postérieurs très robustes avec les cuisses larges, les tibias un peu arqués et carénés. Long. 6 mm.

N^olle Guinée : Sattelberg, Huon Gulf. Unique.

A placer près de *Scimundi* Pic, en diffère par l'avant-corps non foncé, les antennes testacées.

Ora Birói n. sp. (*Helodidae*)

Subovalaire, atténue à l'extrémité, un peu déprimé, brillant, pubescent de gris, roux, à coloration générale pâle en dessus avec la tête rembrunie derrière les yeux, les élytres ayant sur la base des macules brunes, avec, vers le milieu et en dessus, deux rangées transversales de taches diverses brunes. Membres paraissant clairs. Yeux gris, écartés. Thorax court et large, un peu plus étroit que les élytres et plus large que la tête, rétréci en avant, à ponctuation fine et écartée. Écussion peu ponctué. Elytres arqués sur les côtés, très atténus à l'extrémité, fortement explanés sauf au sommet, très finement et non densément ponctués avec des traces de costules. Long. 3 mm.

N^olle Guinée anglaise, leg. Maza lán. Unique.

A placer dans le voisinage de *cassidioides* Bourg.

III. Hétéromères divers

Pour les *Aderidae* (*Hylophilidae*) j'ai étudié autrefois quatorze espèces nouvelles des chasses de Biró, dont 12 de la Nouvelle-Guinée. Dans le présent article, je vais ajouter quatre nouvelles espèces de la Nouvelle-Guinée et une autre nouveauté des Indes.

Aderus simbanganus n. sp. (Aderidae)

Oblong, peu brillant, revêtu d'une pubescence blanche fine et couchée, coloration plutôt roussâtre avec les élytres en partie obscurcis, membres roux. Tête rétrécie et subarquée en arrière, yeux grands, ne touchant pas le bord postérieur, écartés entre eux. Antennes longues et filiformes, à 2^e article court. Thorax plus étroit que la tête, non transversal, un peu rétréci en arrière, sans angle marqué, densément ponctué. Elytres plus larges que le thorax, courts, subarrondis au sommet, impressionnés près de la base avec une autre petite impression en dedans de chaque épaule, fortement et densément ponctués. Pattes minces, les postérieures étant un peu plus fortes. Long. près de 2 mm.

N^elle Guinée : Simbang, Huon Golf. Unique.

Peut se placer près de *sinuatus* Pic, antennes plus longues, coloration plus foncées, élytres plus larges et dépourvus de dessins dénudés.

Aderus huonensis n. sp. (Aderidae)

Oblong, presque opaque, roux, revêtu d'une pubescence fine et couchée blanche continue, membres clairs. Tête plus large que le thorax, tronqué postérieurement, yeux gris, grands, touchant le bord postérieur de la tête, écartés entre eux. Antennes peu longues, filiformes. Thorax court et large, muni d'un sillon transversal postérieur, finement et densément ponctué. Elytres plus larges que le thorax, peu longs, un peu atténués à l'extrémité, impressionnés transversalement en avant, avec un sillon infrahuméral sur chaque élytre, finement et densément ponctués. Pattes courtes, postérieures peu épaissies. Long. 1,5 mm environ.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Unique.

Moins trapu que *Beccarii* Pic, avec la tête moins large et plus noires, les élytres plus étroits et à pubescence uniforme.

Aderus astrolabensis n. sp. (Aderidae)

Oblong, peu brillant, à fine pubescence grise, non hirsute, noir, antennes flaves, à dernier article rembruni et peu épaissi, pattes rousses. Tête plus large que le thorax, tronqué postérieurement, yeux gris, grands, touchant le bord postérieur de la tête, écartés entre eux ; antennes peu longues, grêles, faiblement élargies à l'extrémité. Thorax court, peu large, subarrondi antérieurement, granuleux. Elytres plus larges que le thorax, courts, un peu atténués à l'extrémité, faiblement déprimés antérieurement, sans impression nette, fortement granulés. Pattes courtes, rousses avec les cuisses en partie rembrunies. Long. 1,5 mm.

N^elle Guinée : Erima, Astrolabe Bay. Unique.

Espèce assez particulière par les caractères combinés : forme trapue, coloration générale foncée avec les membres largement clairs.

Aderus Kaszabi n. sp. (Aderidae)

Allongé, un peu brillant, à pubescence claire assez longue et un peu redressée, roux ou testacé, membres compris. Tête un peu plus large que le thorax, subtronquée postérieurement, yeux gris, ne touchant pas le bord postérieur de

la tête, écartés entre eux : antennes assez longues, subfiliformes, un peu élargies à l'extrémité, dernier article pyriforme, peu long. Thorax subcarré, à ponctuation peu forte et dense. Elytres un peu plus larges que le thorax, longs, un peu atténus à l'extrémité, à dépression antérieure à peine marquée, mais sillon infrahuméral net sur chaque étui, fortement et densément ponctués. Pattes un peu longues, postérieures plus fortes. Long. 2 mm environ.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Assez voisin de *sulcicollis* Pic, en diffère par le dernier article des antennes peu long, le thorax sans sillon apparent, etc.

Aderus (Olotelus) inscapularis n. sp. (Aderidae)

Oblong, peu brillant, rêvetu d'une pubescence fine et couchée grise, peu brillant, roux, tête noire abdomen rembruni, élytres ornés, près du milieu, d'une fascie sinuée assez large, brunâtre ; antennes rousses, pattes jaunes avec les cuisses postérieures en partie rembrunies. Tête plus large que le thorax, subtronquée postérieurement, yeux gris, grands, touchant le bord postérieur de la tête, un peu écartés. Antennes indistinctes. Thorax assez court, non transversal, rétréci en avant, un peu élargi et subangulé vers le milieu, sans impression nette. Elytres bien plus larges que le thorax, peu longs, atténus à l'extrémité, à faibles impressions antérieures postscutellaires ou infrahumérales, à ponctuation assez fine et rapprochée. Pattes postérieures épaissees. Long. 2 mm environ.

Indes : Bombay, 1902. Unique.

De fascès se rapproche un peu de *brunneomaculatus* Pic, mais le thorax n'offre pas de profondes impressions et les élytres n'ont pas de macule postscutellaire brunâtre en étant faiblement impressionnés.

Formicomus biróensis n. sp. (Anthicidae)

Grand et allongé, à pubescence grise longue et écartée avec des poils hirsutes, brillant, roux, élytres noirs à base d'un roux jaunâtre moins une partie rembrunie, avec une macule prébasale jaune sur chacun (var. nouv. **matheranus**). Tête longue, rétréci en cône postérieurement, à ponctuation fine et écartée. Antennes rousses, longues. Thorax long, un peu élargi et bombé en avant, à ponctuation forte et rapprochée. Elytres bien plus larges que le thorax, s'élargissant un peu sur le milieu, atténus à l'extrémité, subtronqués à l'apex, à ponctuation assez fine et espacée. Pattes rousses avec les cuisses en partie différemment rembrunies et plus foncées chez la variété. Long. 5—6 mm.

Indes orientales : Matheran, 800 m, 1902. Un paratype de la forme typique dans ma collection.

Par la structure de sa tête se rapproche de *longiceps* Pic dont il diffère, à première vue, par les élytres marqués de clair sur leur base.

Scaptia Birói n. sp. (Scaptiidae)

Petit oblong, rétréci aux deux extrémités, pubescent de gris, presque opaque, roux-testacé, membres pâles. Tête petite, rétrécie et arquée postérieurement, yeux gris écartés ; antennes assez courtes, grêles. Thorax court, rétréci, arqué en avant, en forme de demi-cercles, sans impression et densément ponctué.

Elytres peu plus larges que le thorax, peu longs, atténués à l'extrémité, subarrondis séparément à l'apex, à ponctuation forte et rapprochée. Long. près de 2 mm.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Se rapproche de *infima* Pic du Tonkin, en diffère par la forme de la tête qui est un peu conique postérieurement, le dessus pas très aplati, les élytres fortement ponctués.

Chilopeltis Birói n. sp. (Pythidae)

Oblong-allongé, un peu convexe, brillant, dessous roux, dessus plus ou moins verdâtre, élytres ornés sur chacun d'une petite macule préhumérale et d'une macule transversale postérieure blanches. Antennes claires, à massue foncée ; pattes rousses. Rostre large et différemment long ; tête à ponctuation assez fine, rapprochée. Thorax large, faiblement denticulé sur les côtés, à forte impression de chaque côté de la base et ponctuation assez forte, écartée. Élytres peu longs, faiblement subarqués latéralement, tronqués au sommet, à ponctuation fine, ou très fine, s'effaçant au sommet. Long. 2—2,5 mm.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Petite série, plusieurs paratypes dans ma collection.

Voisin de *maculata* Pic, en diffère par les antennes largement claires, les dessins clairs, des élytres un peu différents : maculiforme en avant, subfascié postérieurement.

Elacatis notaticollis var. nouv. *diversus* (Othniidae)

Diffère de la forme typique par l'avant-corps largement noir et les dessins maculiformes foncés des élytres formant, par leur jonction, des fasciés diverses. Le type, de Roon, est dans la collection Pic, et plusieurs paratypes ont été recueillis par Biró dans la Nouvelle-Guinée, à Simbang, Huon Golf : Mont Hansemann, Astrolabe Bay.

Micropelecotomoides basipubens n. sp. (Rhipiphoridae)

Oblong-allongé, rétréci aux deux extrémités, noir, dessous du corps en partie roux, opaque et densément pubescent en dessus, thorax ayant des macules noires (médiane et latérales antérieures) sur fond gris-jaune, élytres foncés ayant la base, ainsi que la suture, sauf à l'extrémité, garnies d'une pubescence claire. Antennes, sauf premiers articles longuement pectinées, à tige claire et pectinations rembrunies. Pattes. rousses. Long. 4 mm.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Unique.

A placer près de *Corporaali* Pic en se caractérisant par la base des élytres à pubescence claire dense et la suture garnie en partie de même pubescence.

Micropelecotomoides Birói n. sp. (Rhipiphoridae)

Oblong-allongé, rétréci aux deux extrémités, peu brillant, plutôt de coloration générale foncée, un peu roussâtre par places, à pubescence blanchâtre chaque élytre étant orné de lignes longitudinales foncées plus ou moins longues

éloignées de la base et en partie jointes avant l'extrémité. Antennes pectinées, assez minces, brunes avec à la base testacée ; pattes rouges peu rembrunies. Long. 3,5 mm.

N^elle Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Diffère, à première vue, du précédent par le dessin particulier des élytres constitué par des parties alternées pubescentes claires plus larges et des parties foncées plus étroites.

Micropelecotomoides Birói var. nouv. **grandis** (*Rhipiphoridae*)

Plus grand et plus robuste qu'est la forme typique avec le thorax à pubescence plus uniforme, les élytres à bandes foncées aussi larges que les claires, les antennes plus longues, en partie longuement pectinées. Long. 6 mm.

N^elle Guinée : Simbang, Huon Golf. Unique.

Orchesia Birói n. sp. (*Melandryidae*)

Petit, étroit, allongé, plus rétréci postérieurement qu'antérieurement, un peu convexe, peu brillant, à fine pubescence grise, d'un roux testacé avec les membres plus clairs. Tête petite, yeux gris, grands, rapprochés postérieurement, antennes relativement longues, aplatis avec les premiers articles plus étroits. Thorax assez court, rétréci en avant, pas plus large que les élytres à la base, sans impression marquée, finement et non densément ponctué. Elytres longs, très rétrécis postérieurement, ayant une strie présuturale, assez rarement et non densément ponctués. Pattes antérieures minces de même que les intermédiaires, postérieures avec les cuisses et tibias élargis, ces derniers munis de deux grands éperons, tarses très longs et grêles. Long. 3 mm environ.

N^elle Guinée : Simbang, Huon Golf. Unique.

Je n'ai pas connaissance d'une ancienne espèce du genre provenant de la Nouvelle-Guinée.

Birónida n. gen. (? *Melandryidae*)

Antennes longues, filiformes. Tête plus étroite que le thorax ; yeux grands, très échancrés. Dernier article des palpes maxillaires cultriforme. Thorax robuste, court, rétréci en avant et en arrière, plus étroit que les élytres. Pattes antérieures non épaisses (postérieures manquantes) et tibias sans éperons.

Il se peut que ce nouveau genre, établi pour l'espèce nouvelle suivante, peut se ranger dans les *Melandryidae*, en se rapprochant de *Brasiliandum* Pic, mais son avant-corps est tout autre et particulier. Même un peu certains *Anobiidae*, ainsi que des *Scriptiidae*.

Birónida granulosa n. sp. (? *Melandryidae*)

Oblong-allongé, un peu brillant, orné d'une pubescence soyeuse d'un gris blanchâtre non continue en laissant des parties dénudées sur le dessus du corps, noir teinté de roussâtre places. Membres testacés, sommet des tibias et partie des cuisses rembrunies. Tête rousse, granuleuse ; 2^eme article des anten-

nes court, 3^{ème} et suivants longs. Thorax plutôt noir, ayant sa plus grande largeur vers le milieu, un peu inégal en dessus, granulé. Elytres assez longs, presque parallèles, un peu atténus à l'extrémité, impressionnés largement vers la base et vers l'extrémité, granulés. Long. 5,5—6 mm.

N^elle Guinée : Stephansort, Astrolabe Bay, 26. VI. 1897. Vu deux exemplaires dont un très mutilé dans ma collection.

Birólagria n. gen. (*Lagriidae*)

Taille grande ; forme oblongue-allongés, antennes simples, à dernier article peu long. Tête et thorax d'une structure particulière et caractérisant principalement le genre. Tête en arrière munie de deux gibbosités séparées par un profond sillon médian. Thorax ayant, sur son milieu, une incision allongée au fond de laquelle se trouve une partie allongée plus claire, plissée et ponctuée irrégulièrement. Elytres munis d'un court repli huméral sur chacun, à ponctuation fine et irrégulière.

Genre à placer près de *Lagria* F. et établi pour l'espèce suivante.

Birólagria cicatricosa n. sp. (*Lagriidae*)

Grand, oblong-allongé, à pubescence grise peu distincte, en partie soulevée ; très brillant, noir métallique, teinté de verdâtre avec les élytres jaunes, membres foncés, base des cuisses rousses. Tête longue, de structure particulière, à ponctuation forte et un peu écartée ; yeux très distants, antennes courtes, assez robustes, élargies à l'extrémité, dernier article ayant presque deux fois la longueur du précédent. Thorax plus long que large, à structure particulière, sinué et impressionné sur les côtés, incisé au dessus, bien plus étroit que les élytres. Elytres longs, un peu élargis après le milieu et courtement atténus à l'extrémité, ayant un pli huméral court et large sur chacun, à ponctuation très fine, rapprochée, ayant un rebord latéral très distinct. Pattes assez courtes, peu fortes. Long. 15 mm.

N^elle Guinée : Simbang, Huon Golf. Unique.

Bothricara multiimpressa n. sp. (*Lagriidae*)

Oblong, élytres très larges par rapport à l'avant-corps, ornés de quelques poils gris, sans partie pubescente dense, un peu brillant, noir, parties des épipleurs et des membres teintées roussâtre. Tête à ponctuation ruguleuse assez fine et dense, yeux écartés ; antennes grêles, foncées, à base teintée de roussâtre. Thorax assez court, peu large, un peu rétréci près de la base, inégal en dessus, à ponctuation ruguleuse dense. Elytres assez courts, bombés, atténus à l'extrémité, à dépression transversale antérieure, ornés de grosses impressions espacées et diverses, à ponctuation plutôt espacée faite de points divers. Pattes foncées, en partie teintées de roussâtre. Long. 14 mm.

N^elle Guinée : Stephansort, Astrolabe Bay. Paratype dans ma collection.

Voisin de *auratofasciata* Borchm., très distinct par l'absence de bande pubescente et les grandes impressions multipliées des élytres.

Sora Birói n. sp. (*Lagriidae*)

Etroit et allongé ; brillant, peu pubescent de gris, roux-testacé, élytres brins avec un dessin sutural jaune en partie bircruciforme, la base et le sommet latéral des élytres étant teintes de clair. Tête longue, peu ponctuée, creusée entre les antennes, yeux grands, peu écartés, antennes claires, grêles et longues, à dernier article très long, à peu près de la longueur des deux précédents réunis. Thorax long, un peu large, faiblement étranglé près de la base, angles postérieurs marqués, ayant une ponctuation plus fine antérieurement que postérieurement. Elytres un peu plus larges que le thorax, longs, atténus, à l'extrémité, fortement striés-ponctués avec les intervalles étroits un peu surélevés. Pattes testacées, longues. Long. 12 mm.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Unique.

Se rapproche de *distigma* Pic, du Cambodge, avant-corps plus large, élytres plus atténus à l'extrémité et dessins des élytres différents.

Synattractus Birói n. sp. (*Lagriidae*)

Oblong-allongé, brillant, paraissant glabre, testacé avec les élytres noirs teintés de verdâtre ; antennes noires avec les trois premiers articles testacés, très finement ponctué ainsi que le thorax, ayant un sillon occipital. Thorax court et large, arrondi sur les côtés antérieurs, fortement marginé sur la base et un peu impressionné devant l'écusson, angles postérieurs saillants. Elytres plus larges que le thorax, très atténus à l'extrémité, plus ou moins finement striés-ponctués, les stries se prolongeant presque jusqu'au sommet, intervalles en partie larges et déprimés antérieurement. Long. 10 mm.

N^elle Guinée : Stephansort, Astrolabe Bay. Unique.

Diffère de *neoguineensis* Pic, par la taille plus avantageuse, les larges intervalles des élytres, la tête et les pattes entièrement claires.

Synattractus impressus n. sp. (*Lagriidae*)

Oblong, un peu large, très brillant et glabre, roux-testacé avec les élytres noirs, membres en partie noirs. Tête assez courte et large, presque imponctuée ainsi que le thorax, ayant un sillon médian ; antennes noires avec les deux premiers articles testacés. Thorax assez court et large, subarrondi sur les côtés antérieurs, un peu impréssionné sur son milieu postérieur (avec parfois d'autres impressions paraissant anormales). Elytres peu longs et assez larges, un peu élargis postérieurement et atténus à l'extrémité, fortement impressionnés transversalement près de la base, et un peu en dedans des épaules qui sont saillantes, ayant antérieurement quelques fines stries ponctuées. Pattes d'un roux testacé avec les tibias diversement et tarses noirs. Long. 9—10 mm.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Paratype dans ma collection.

Caractérisé par sa structure élytrale particulière.

Synactractus semisuturalis var. nouv. **atrocephalus** (*Lagriidae*)

Tête noire sauf antérieurement, thorax et élytres clairs, suture noire plus largement en avant ; dessous du corps foncé ; pattes bicolores.

N^{le} Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Diffère de la forme typique par la tête et le dessous du corps foncés, les élytres seulement noirs sur la suture.

Allecula vernicata n. sp. (*Alleculidae*)

Grand, allongé, rétréci aux deux extrémités, subconvexe, très brillant, et un peu vernissé, de coloration générale roussâtre, un peu métallique en dessus. Tête peu longue, yeux gris, assez rapprochés, à ponctuation fine, écartée ; antennes grêles et longues. Thorax assez long, rétréci en avant, plus étroits que les élytres, nettement impressionné sur son milieu postérieur à ponctuation fine, diversement écartée. Elytres longs, atténus à l'extrémité, ayant de nombreuses stries-ponctuées peu profondes qui se joignent, ou s'oblitèrent en partie, postérieurement, à sculpture irrégulière. Pattes très longues avec les cuisses peu épaisses, tibias antérieurs sinués en dedans. Long. 15 mm.

N^{le} Guinée : Sattelberg, Guon Golf. Unique.

Ressemble un peu à *palambangana* Pic, mais avec, comme différences : thorax plus étroit et éparsément ponctué, aspect très brillant, élytres inégalement sculptés postérieurement.

Allecula Birói n. sp. (*Alleculidae*)

Allongé, plus rétréci postérieurement qu'antérieurement, étroit, assez brillant, à pubescence claire un peu soulevée, de coloration générale rousse au brunâtre, membres clairs. Tête à ponctuation forte et peu écartée avec les yeux un peu plus écartés chez ♀ que chez ♂. Antennes testacées, peu longues. Thorax court et large, à peu près de la largeur des élytres, triimpressionné postérieurement, à ponctuation pupilleuse, peu forte et peu rapprochée. Elytres plutôt longs, atténus à l'extrémité, striés-ponctués, les intervalles étant larges et ponctués. Pattes peu longues, cuisses peu épaissies. Long. 9—10 mm.

N^{le} Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Paratype dans ma collection.

Ressemble assez à *opaca* Pic, mais le thorax est plus large par rapport aux élytres et l'aspect est brillant.

Allecula neoguineensis n. sp. (*Alleculidae*)

Étroit, allongé, un peu brillant et hirsuts, de coloration testacée. Tête à ponctuation forte et dense, yeux gris, peu écartés ; antennes grêles et très longues. Thorax non transversal, rétréci en avant, plus étroit que les élytres, impressionné longitudinalement sur son milieu, à ponctuation pupilleuse rapprochée. Elytres longs, atténus postérieurement, à stries-ponctuées régulières.

lières, se réunissant en partie à l'extrémité, avec les intervalles étroits et ponctués. Pattes longues et grêles, testacées avec le sommet des cuisses et la base des tibias testacés. Long. 10 mm.

N^{le} Guinée : Friedrich-Wilhelmshafen. Unique.

Peut se placer près de *malabarensis* Pic, moins brillant, plus pâle, thorax d'une autre structure, etc.

***Cistelopsis Birói* n. sp. (*Alleculidae*)**

Subovalaire, un peu convexe, très brillant, presque glabre, roussâtre avec les membres testacés. Tête courte, finement ponctuée, yeux gris, grands, très rapprochés ; antennes claires, un peu épaissies. Thorax court et large, rétréci en avant, de la larguer des élytres, à ponctuation très fine, écartée. Elytres assez courts, subarqués sur les côtés, atténus à l'extrémité, finement striés-ponctués, plus fortement sur les côtés. Pattes non épaissies. Long. 4,5 mm.

N^{le} Guinée : Sattelberg, Huon Golf, paratype in collection Pic.

Espèce se distinguant à première vue des espèces du genre de ma connaissance par son aspect très brillant.

***Cistelopsis nitidior* n. sp. (*Alleculidae*)**

Petit, subovalaire, très brillant, glabre, de coloration roussâtre avec les élytres en partie rembrunis, devant de la tête et pattes testacés ; antennes foncées à base claire, ces organes étant un peu épaissis. Tête courte, yeux se touchant presque. Thorax court et large, rétréci en avant, de la largeur des élytres, à ponctuation fine peu écartée. Elytres un peu convexe, subarqués sur les côutés, atténus à l'extrémité, plus ou moins finement striés-ponctués. Pattes courtes, plutôt minces. Long. 3,5 mm.

N^{le} Guinée : I. Bertrand (Taravaj). Vu 5 exemplaires, deux paratypes dans ma collection.

Très distinct du précédent par sa plus petite taille, ses élytres larges avec les antennes en partie foncées, noires ou brunâtres.

***Cistelopsis* sous-gen. nouv. *Macrocistelopsis* (*Alleculidae*)**

Ce sous-genre est établi pour l'espèce nouvelle suivant et se caractérise par les caractères conjugués de la forme très bombée avec une pubescence très distincte.

***Macrocistelopsis testaceicolor* n. sp. (*Alleculidae*)**

Oblong, relativement grand, très convexe et nettement pubescent de gris, un peu brillant, de coloration générale testacée. Tête densément ponctuée, yeux transversaux, écartés ; antennes assez grêles, peu longues. Thorax en forme de demi-cercle, de la largeur des élytres, un peu impressionné au milieu de la base, à ponctuation fine et dense. Elytres un peu longs, atténus à l'extrémité, à ponctuation assez fine et peu écartée. ayant seulement en arrière

des traces de stries et latéralement une strie prolongée au dessus de laquelle se trouve une autre raccourcie. Pattes courtes, cuisses assez larges. Long. 9 mm.

N^elle Guinée : Tamara, Berlindhafen. Paratype dans ma collection.

La var. **latior** (un exemplaire de Erima) est moins allongée et plus large, un peu roussâtre et se distingue, en outre, de la forma typique, par la strie latérale supérieure des élytres plus forte et prolongée presque jusqu'à la base.

Copodita testaceithorax var. nouv. **atrobasisalis** (*Oedemeridae*)

Presque opaque, roux-testacé, côtés du thorax avec une ligne foncée raccourcie, élytres noirs ayant une large partie suturale orangée, cette partie isolée de la base est large en avant, rétrécie postérieurement ; antennes testacées, en partie annelées de brun ; pattes bicolores, testacés avec les tibias à tarses plus ou moins noirs. Long. 9 mm.

N^elle Guinée : Simbang, Huon Golf. Unique.

Diffère de la forme typique par la présence d'une ligne latérale foncée (au lieu d'une macule) au thorax, la coloration différente des élytres avec la partie orangée éloignée de la base.

Copodita Kaszabi n. sp. (*Oedemeridae*)

Allongé, assez étroit, brillant, peu distinctement pubescent de gris, testacé avec la tête rembrunie sur son milieu, les côtés du thorax aussi de brun ainsi que le milieu brièvement. Antennes rembrunies avec la base testacée ; longues et grêles. Thorax assez long, élargi en avant, orné de trois impressions discales, une allongée de chaque côté, une basale, à ponctuation forte et rapprochée. Elytres plus larges que le thorax, peu longs, atténus à l'extrémité, costulés vers la suture, ayant postérieurement une ponctuation très fine et dense. Long. 8—9 mm.

N^elle Guinée : Seleo, Berlindhafen. Paratype dans ma collection.

Bien distinct des espèces décrites de la Nouvelle-Guinée, par sa coloration largement claire jointe aux lignes brunes du thorax.

Sessinia samarensis var. nouv. **bicoloripes** (*Oedemeridae*)

Très brillant, et robuste sur l'avant-corps, la tête étant noire et le thorax roux, élytres un peu brillants, et pubescents de gris, très atténus à l'extrémité, testacés et brièvement marqués de foncé à l'apex. Antennes longues et grêles, noires ainsi qu'une partie des pattes ; dessous du corps noir.

N^elle Guinée : Tamara, Berlindhafen. Unique.

Diffère de *samarensis* Pic, par le dessous du corps et les pattes en partie foncé.

Sessinia curtemarginata n. sp. (*Oedemeridae*)

Allongé, peu brillant, pubescent de gris, roux-testacé, dessous du corps en partie noir, élytres noirs, étroitement bordés de clair suture comprise (*forma typica*), ou entièrement noirs avec la tête largement foncée (var. *immarginata*).

Antennes et pattes noires avec la base des cuisses et partie des tibias testacés. Antennes longues et grêles. Thorax long, un peu élargi près du milieu, impressionné en avant et en arrière, assez fortement ponctué. Elytres plus larges que le thorax, pas très longs, atténués à l'extrémité, sans ou avec une faible costule discale, finement et densément ponctués. Long. 9—10 mm.

I. Deslacs. Un paratype de la forme typique dans ma collection.

Très distinct du précédent, en outre de la coloration, par le thorax moins large et moins brillant.

Sessinia seleona n. sp. (*Oedemeridae*)

Allongé, peu brillant, pubescent de gris, roux-testacé avec les élytres plus ou moins foncés latéralement. Long. 9 mm.

N^elle Guinée : Seleo, Berlindhafen. Paratype dans ma collection.

Distinct du précédent par les membres clairs, ainsi que le dessous du corps, tandis que les élytres sont plus ou moins largement clairs vers la suture. Peut-être simple variété.

Sessinia Dohertyi Pic (*Oedemeridae*)

Espèce variable, la forme typique ayant les élytres testacés et plus ou moins noirs ou rembrunis sur les côtés avec parfois la partie foncée limitée à l'extrême base. L'explorateur Biró, a capturé en Nouvelle-Guinée, et dans de nombreuses localités, un grand nombre d'exemplaires avec deux nuances extrêmes qui sont : var. **Birói**, ayant les élytres entièrement clairs (un paratype dans ma collection) et var. **Csikii**, ayant les élytres largement noirs et un peu marqués de clair vers la suture.

Sessinia triimpressa n. sp. (*Oedemeridae*)

Allongé, peu brillant, entièrement testacé membres compris. Tête densément ponctuée ; antennes grêles, assez longues. Thorax long, un peu élargi vers la milieu, avant en dessus 3 grandes impressions avec une ponctuation forte et rapprochée. Elytres plus larges que le thorax, assez longs, atténués à l'extrémité, ayant sur chacun antérieurement deux petites costules, à ponctuation fine et dense. Long. 12 mm.

N^elle Guinée : Seleo, Berlindhafen, 1900 ; Friedrich-Wilhelmshafen.

Vu plusieurs exemplaires paratype dans ma collection.

Ressemble à *Dohertyi* Pic, moins brillant avec les élytres ayant des costules.

Sessinia brevelineata var. nouv. **neoguineensis** (*Oedemeridae*)

De coloration générale claire, avec l'abdomen plus ou moins foncé, les élytres foncées, largement marqués de clair avec une bande présuturale plus ou moins longue, parfois divisée postérieurement en deux branches. Pattes entièrement claires ou genoux et tibias en partie rembrunis. Long. 13—14 mm.

N^elle Guinée : Seleo, Berlindhafen. Petite série dont plusieurs paratypes dans ma collection.

Chez la forme typique, la bande claire présuturale des élytres est étroitement courte.

Sessinia brevelineata var. nouv. **testacea** (*Oedemeridae*)

Entièrement de coloration testacée, membres compris, sauf l'abdomen en partie noir ou rembruni.

N^elle Guinée : Seleo, Berlindhafen. Paratypes dans ma collection.

Mimoselenopalpus sous-gen nouv. **Birónopalpus** (*Oedemeridae*)

Dernier article des palpes très transversal, échancré en arc au sommet, les deux pointes étant émoussées. Antennes grêles. Elytres ornés chacun de 3 petites côtes.

Sous-genre caractérisé par la structure du dernier article des palpes, établi pour la nouvelle espèce suivante.

Birónopalpus impressicollis n. sp. (*Oedemeridae*)

Etroit et allongé, en partie opaque, pubescent de gris, testacé, sauf partie antérieure, antennes, élytres et majeure partie des pattes noirs. Tête courte et large avec les yeux très grands et se touchant presque ; antennes grêles. Thorax plus long que large, rétréci et subarqué en avant, faiblement resserré près de la base avec les angles postérieurs marqués, brillant, fortement et transversalement impressionné sur sa partie antérieure, vers le milieu de chaque côté, postérieurement, devant l'écusson, à ponctuation assez forte et écartée. Elytres presque opaques, plus larges que le thorax, assez longs, un peu atténus à l'extrémité, ornés chacun de trois faibles côtés, à ponctuation ruguleuse fine et dense. Pattes foncées avec les cuisses largement testacées à la base. Long. 12 mm.

N^elle Guinée : Sattelberg, Huon Golf. Unique

Danerces suturalis var. nouv. **Birói** (*Oedemeridae*)

Coloration générale testacée avec les élytres noirs ornés d'une ligne suturale claire, se prolongeant antérieurement autour de l'écusson et non prolongée jusqu'à l'extrémité.

N^elle Guinée : Simbang, Huon Golf, 1899. Unique.

La forme typique à l'avant-corps en partie foncé avec la ligne suturale claire différente.