

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA

ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK

(SERIES NOVA)

XXXI. 1.

1978

p. 23-29

Description de nouvelles espèces de Lamières de Nouvelle Calédonie I.

Par

S. BREUNING

(recu le 5 janvier, 1978)

Abstract: Description of 2 new genera and 24 new species of Cerambycidae - Lamiinae (Coleoptera) collected by Dr. J. Balogh in New Caledonia.

Monsieur le Directeur Générale Dr. Z. KASZAB était si aimable de me communiquer un assez grand lot de Lamières de Nouvelle Calédonie récolté par le Dr. J. BALOGH. Parmi ce lot se trouvaient un nombre de nouvelles espèces dont voici les descriptions. Tous les types se trouvent au Musée de Budapest.

Enicodes kaszabi sp. n.

Proche de schreibersi Thoms., mais le pronotum moins transverse, à peine ridé en travers, à bande médiane longitudinale dénudée plus étroite, les élytres sans aucune tache ochracée, ornés sur le bord latéral d'étroites bandes longitudinales jaunes, qui sont à peines visibles chez le mâle; les articles antennaires 9 à 11 d'un brun clair.

Type un ♂ de l'Ile Lifou: Chépénéle, 20 II 1977; un Allotype et plusieurs Paratypes idem et de Bjengen, 21 II 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Lepturonota tristis Montr. m. transversefasciata m. n.

Comme la forme typique, mais les deux taches prémédiane de l'élytre réunies en une bande transversale complète qui est jaune de même que les taches élytrales.

Type de Thiébaghi, 16 II 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Nemaschema ochreovittatum, sp. n.

Antennes d'un quart plus longues que le corps, le troisième article aussi long que le quatrième. Front transverse. Pronotum à peine aussi long que large, très faiblement arrondi sur les côtés, assez fortement ridé en travers dans la partie médiane du disque. Elytres impuntués, pourvus, chacun, de 4 dépressions longitudinales, dont la première et les deux latérales sont complètes, et dont la deuxième à partir de la suture débute à la fin du cinquième basilaire et s'étend jusqu'un peu avant l'apex.

Brun noir. Le front, les joues et la partie antérieure du vertex couverts en grande partie de pubescence ochracée. Pronotum avec deux bandes transversales ochracées, l'une rapprochée du bord antérieur, l'autre rapprochée du bord postérieur et de taches ochracées

un peu vagues dans la partie médiane. Chaque élytre orné de 4 bandes longitudinales ochracées, dont les 3 latérales sont interrompues au tiers basilaire. Trochanters et partie basilaire des fémurs rouge, la moitié apicale des fémurs couverte de pubescence ochracée.

Long. : 12-14 mm; larg. : 2,5 - 3 mm.

Type du Mont Rembai, 19-21 I 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Plusieurs Paratypes idem.

Nemaschema rufithorax sp. n.

Proche de lineatum Fauv., mais le lobes inférieurs des yeux sensiblement plus longs que les joues, le pronotum nullement ridé en travers et la livrée différente.

Brun foncé; le pronotum rouge sauf à son bord antérieur et à son bord postérieur. Sur chaque élytre dans la partie postmédiane des bandes longitudinales blanchâtres situées entre les crêtes. Le bord inférieur de l'oeil et des taches au bord inférieur de la partie latérale du pronotum et sur les côtés des sterna, à pubescence blanche. Une bande transversale blanche au bord postérieur du premier segment abdominal et des taches blanches sur les côtés des segments deux à quatre.

Long. : 13 mm; larg. : 2,75 mm.

Type du Mont Rembai, 19-21 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Nemaschema paracomitessa sp. n.

Antennes d'un tiers plus longues que le corps, le troisième article sensiblement moins long que le quatrième, les lobes inférieurs des yeux aussi longs que les joues. Pronotum un peu plus long que large, faiblement arrondi sur les côtés, tout le disque très densément couvert de pustules minimes. Elytres profondément échancrés à l'apex; imponctués et pourvus, chacun, d'une dépression longitudinale complète et bien accusée à côté de la suture.

Noir. Les yeux étroitement cernés d'ochracé. De chaque côté du disque du pronotum une bande longitudinale ochracée. Une plus étroite bande longitudinale jaune débute au bord postérieur de l'oeil, parcourt la partie inférieure de la partie latérale du pronotum, couvre ensuite les mes- et metepisternes en y devenant ochracée et se prolonge ensuite jusqu'à l'apex du corps par les côtés des segments abdominaux. Sur chaque élytre une bande longitudinale blanchâtre assez vague dans la dépression juxta suturale, interrompue à la fin du cinquième basilaire et au milieu de sa longueur et une bande longitudinale disco-latérale ochracée, largement interrompue au milieu de sa longueur et élargie après cette interruption en une tache ovulaire. Tarses à fine pubescence blanchâtre.

Long. : 11 mm; larg. : 2,25 mm.

Type du Col d'Amieu, 19 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Mimenicodes flavolineatus sp. n.

Antennes un peu plus longues que le corps, le troisième article aussi long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux de moitié plus longs que les joues. Pronotum aussi long que large, légèrement étranglé avant la base, à peine arrondi aux côtés. Elytres très longs, imponctués, fortement obliquement tronqués à l'apex (l'angle sutural non indiqué, l'angle marginal étiré en un long lobe étroit et pointu, le bord latéral avant cet angle légèrement concave); sur chaque élytre une dépression longitudinale, large dans la moitié antérieure, très étroite dans la moitié postérieure.

Brun foncé. Deux taches ochracées situées entre les lobes supérieurs des yeux. Front, joues et tempes avec des taches jaunâtres. Pronotum avec une ligne longitudinale médiane jaune pâle, quelques petites taches pareilles en forme de bande longitudinale de chaque côté du disque, un anneau longitudinale jaune pâle de chaque côté au bord latéral du disque et une ligne longitudinale jaune pâle au bord inférieur de la partie latérale. Ecusson à pubescence jaune pâle. Sur chaque élytre 4 lignes longitudinales jaune pâle: une à côté de la suture, une disco-suturale parcourant seulement le quart basilaire, une discale complète mais interrompue à la fin de quart basilaire et une disco-latérale parcourant plus que le tiers médian. Les parties latérales du dessous de corps à pubescence jaune pâle.

Long. : 10 mm; larg. : 2 mm.

Type du Col d'Amieu, 19 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Tricondyloides parinermis sp. n.

Proche d'inermis Breun., mais le scape un peu moins long que le troisième article des antennes; sur chaque élytre une épine postbasilaire discal minimale.

Entièrement d'un brun rougeâtre foncé, la tête et le pronotum ornés de taches jaunes; l'écusson a dense pubescence jaune; l'élytre orné de nombreuses étroites bandes longitudinales jaunes, toutes acinées en de nombreuses courtes taches.

Long.: 7-8 mm; larg.: 2,5 mm.

Type du Mont Rembai, 19-21 I 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Des Paratypes idem.

Paracondyloides gen. n.

Allongé. Antennes fines, aussi longues que le corps, peu densément frangées de poils assez courts; le scape assez court, modérément fort, le troisième article un peu plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape, le quatrième article beaucoup plus long qu'un des articles suivants. Tubercules antennifères très distants l'un de l'autre et à peine saillants. Yeux assez grossièrement facettés et subdivisés. Front très large. Pronotum aussi long que large, très convexe, faiblement arrondi sur les côtés. Elytres un peu plus larges que le pronotum, très convexes, élargis au milieu, arrondis à l'apex, assez densément ponctués et garnis de longs poils dressés; l'épaule formant un petit lobe obtus se dirigeant vers l'extérieur. Tête non retractile. Saillie prosternale peu large, aussi haute que les hanches et arrondie. Saillie mesosternale peu large et légèrement inclinée vers l'avant. Métasternum raccourci. Ailes atrophiées. Cavités coxales intermédiaires fermées. Pattes assez longues, les fémurs pédonculés, les tibias intermédiaires avec un sillon dorsal, les tarses divariqués.

Type: flavofasciatus Breun. Ce genre se place parmi les Parmenini Breun., à côté du genre Tricondyloides Montr.

Paracondyloides flavofasciatus sp. n.

Lobes inférieurs des yeux beaucoup moins longs que les joues. Tête et pronotum impunctués. Sur chaque élytre une courte et faible crête longitudinale discal basilaire; chaque élytre assez densément et peu finement ponctué au quart basilaire, très éparsément ensuite.

Brun rougeâtre foncé, couvert d'une très épaisse pubescence jaunâtre. Sur chaque élytre une très large bande transversale jaunâtre postmédiane à pubescence dense remontant obliquement de la suture en direction du bord latéral. Moitié basilaire des fémurs rouge. Les tibias largement annelées de jaunâtre avant le milieu et avant l'apex; les tarses en grande partie jaune rougeâtre. Le quart basilaire des articles antennaires 4 à 11 jaunâtre.

Long.: 7 mm; larg.: 3 mm.

Type du Col d'Amieu, 19 I 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Paratypes idem; un Paratype de Bourail, 26-27 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Macrocleptes tuberculipennis sp. n.

Proche de caledonicus Breun., mais beaucoup plus petit, les articles antennaires 5 à 11 réunis sensiblement plus longs que le troisième article, les élytres pourvus de nombreux tubercules un peu plus grands, mais sans tubercule postmédian plus grand que les autres.

Long.: 7 mm; larg.: 3 mm.

Type de Bourail, 26-27 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Blapsilon baloghi sp. n.

Proche d'irroratum Pasc., mais l'épine latérale du pronotum beaucoup plus longue et plus pointue, la tubercule latéro-supérieur du pronotum également plus proéminent et sur le côté du disque du pronotum une grande tache nette jaune blanchâtre élançée.

Type de l'île des Pins, 23-27 II 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Paratypes idem et de Noumea, Mont Koghu, 12-13 II 1977 et du Mont Rembai, 19-21 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Blapsilon kaszabi sp. n.

Proche d'irroratum Pasc., mais l'épine latérale du pronotum plus mince, le tubercule latéro-supérieur du pronotum à peine indiqué, l'épaule moins saillante du côté, les élytres encore plus densément ponctués, presque sans crêtes longitudinales et couverts surtout dans la moitié postérieure de très nombreuses petites taches circulaires ochracées.

Type du Mont Rembai, 19-21 I 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Plusieurs Paratypes idem.

Callapoecoides gen. n.

Allongé. Antennes fines, d'un tiers plus longues que le corps, éparsément frangées de poils très courts; le scape modérément long et peu fort, le troisième article un peu plus long que le quatrième, beaucoup plus long que le scape, le quatrième article beaucoup plus long qu'un des articles suivants. Tubercules antennifères distants l'un de l'autre et peu saillants. Yeux peu finement facettés et fortement échannés. Front très transverse. Pronotum fortement transverse, pourvu d'une assez longue épine latérale conique et de chaque côté du milieu du disque d'un très petit tubercule. Elytres longs, un peu plus larges que le pronotum, modérément convexes, arrondis à l'apex. Tête non retractile. Saillie prosternale aussi haute que les hanches, assez large et arrondie. Saillie mesosternale assez large, légèrement inclinée vers l'avant. Mésternum de longueur normale. Cavités coxales intermédiaires fermées. Pattes de longueur moyenne, les fémurs pédonculés, les tibiaux intermédiaires, à léger sillon dorsal, les tarses divariqués.

Type: alboscutellaris Breun. Ce genre se place parmi les Acanthoderini Lac. à côté du genre Callapoecus Bat.

Callapoecoides alboscutellaris sp. n.

Lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues. Vertex éparsément et très finement ponctué. Pronotum densément et peu finement ponctué. Ecusson pentagonal. Elytres densément et finement granulés à la base, ensuite lentement de plus en plus moins densément et plus finement ponctués jusqu'à l'apex.

Brun foncé; entièrement densément marbré de brun jaunâtre. Ecusson à pubescence blanche. Tiers apical des tibiaux et les tarses à dense pubescence gris clair. Antennes à pubescence brune, l'extrême base des articles 4 à 11 à pubescence jaune pâle.

Long.: 11 mm; larg.: 3,75 mm.

Type du Mont Rembai, 19-21 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis albovittata sp. n.

Allongé, assez large. Antennes un peu plus longues que le corps, le troisième article aussi long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux sensiblement plus longs que les joues. Pronotum transverse, assez fortement arrondi sur les côtés. Elytres imponctués, arrondis à l'apex.

Noir à pubescence brun foncé. La partie entre les deux yeux et celle au bord postérieur de chaque oeil à pubescence blanchâtre. De chaque côté au bord latéral du disque du pronotum une bande longitudinale blanchâtre et une ligne blanchâtre le long du milieu de pronotum. Sur chaque élytre une bande longitudinale disco-latérale blanche partant du côté interne de l'épaule et s'étendant vers l'arrière jusqu'au milieu de la longueur de l'élytre, suivie ensuite par une bande longitudinale ondulée pareille jusqu'au début du cinquième apical; la partie latérale de l'élytre parsemée de petites taches blanchâtres. Pattes et scape rougeâtres, les articles antennaires suivants bruns, l'extrême base des articles 5 à 11 à pubescence blanchâtre.

Long.: 3,5 mm; larg.: 1,25 mm.

Type de Caavatch, 5 II 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis brunneofasciata sp. n.

Allongé. Antennes d'un quart plus longues que le corps, le scape modérément long et peu fort, le troisième article un peu moins long que le quatrième, un peu plus long que le scape. Lobes inférieurs des yeux de moitié plus longs que les joues. Pronotum presque aussi

long que large, assez fortement arrondi dans la partie médiane. Elytres longs, un peu plus larges que le pronotum, arrondis à l'apex et pourvus de quelques bourrelets longitudinaux.

Brun, couvert de pubescence jaune paille. Pronotum avec des bandes longitudinales brun clair vagues et de chaque côté du milieu du disque d'une étroite bande longitudinale brun assez foncé. Sur chaque élytre une courte et étroite bande longitudinale discale basilaire brun foncé et une étroite bande longitudinale brun foncé au milieu du disque, débutant à la fin du quart badilaire et s'étendant jusqu'au début du tiers apical et une très courte bande pareille préapicale près de la suture. La partie préapicale des fémurs et les parties postbasilaires et médianes des tibias à pubescence brune. Le troisième article des tarses a pubescence brune. Les articles antennaires 3 et 4 marbrés du brun, les articles 5 à 11 rembrunis en sens augmentant sauf à la base.

Long.: 6 mm; larg.: 2,5 mm.

Type du Mont Rembai, 19-21 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis subunicolor sp. n.

Proche d'unicolor Breun., mais les lobes inférieurs des yeux de moitié plus longs que les joues, le pronotum un peu plus large, les élytres imponctués; toute la pubescence du corps d'un jaune grisâtre; de chaque côté du disque du pronotum une toute petite tache circulaire postmédiane brun foncé; la partie apicale des articles antennaires 4 à 11 brun foncé.

Type de l'Ile de Lifou: Bjengen, 21 II 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Un paratype idem.

Stenellipsis baloghi sp. n.

Proche de caledonica Fauv., mais les antennes un peu plus longues que le corps, les lobes inférieurs des yeux trois fois aussi longs que les joues, la bosse discale postbasilaire de l'élytre un peu plus accusée et la livrée différente.

Brun foncé; sur chaque élytre une tache allongée discale apicale gris clair; les tibias largement annelés de jaune un peu avant le milieu, les tarses jaune rougeâtre, seul l'article 8 des antennes et l'extrême base du neuvième article sont jaunes.

Type de l'Ile des Pins, 23-27 II 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis basipustulata sp. n.

Allongé. Antennes un peu plus longues que le corps, le troisième article aussi long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues. Pronotum un peu transverse, assez fortement arrondi sur les côtés. Elytres imponctués, arrondis à l'apex et pourvus, chacun, d'une bosse ronde discale postbasilaire bien développée.

Brun, à pubescence brun foncé; tout le dessus parsemé de taches gris clair qui en partie se réunissent. Les pattes et les 4 premiers articles antennaires d'un rouge clair, les articles antennaires 5 à 11 à pubescence d'un brun assez foncé.

Long.: 3 mm; larg.: 1,20 mm.

Type d'Aoupinié, 31 I 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Un Paratype de Caavatch, 5 II 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis albopuncticollis sp. n.

Très allongé. Antennes un peu plus longues que le corps, le troisième article un peu moins long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux sensiblement plus longs que les joues. Pronotum un peu plus long que large, très faiblement arrondi sur les côtés. Elytres longs, imponctués, arrondis à l'apex et pourvus, chacun, d'une très petite bosse discale basilaire.

Brun foncé à pubescence brune; de chaque côté du disque du pronotum deux très petites taches circulaires prémédianes jaune pâle, l'une rapprochée du milieu, l'autre discolatérale; le tiers latéral de l'élytre à partir du deuxième quart à fond rougeâtre. Les élytres parsemés sur les 3 quarts postérieurs de nombreuses très petites taches jaune pâle et de deux taches pareilles un peu plus grandes sur chaque épaule. Les tibias annelés de jaune avant le milieu et à l'apex.

Long.: 5 mm; larg.: 1,5 mm.

Type de l'Ile de Lifou: Chépénéle, 20 II 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis kaszabi sp. n.

Proche de strandi Breun., mais le troisième article des antennes aussi long que le quatrième, seulement un peu plus long que le scape, le scape grossi dans sa moitié apicale.

Brun foncé, les élytres à pubescence jaunâtre et densément parsemés de petites taches circulaires brunes qui confluent en une grande tache médiane suturale et en partie aussi au quart basilaire. Pattes et les 3 premiers articles antennaires jaune rougeâtre, les articles 4 à 11 d'un brun assez foncé.

Type de Noumea: Mont Koghi, 12-13 II 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Un Paratype idem. 2 Paratypes d'Aoupinié, 31 I 1977.

Stenellipsis rufomarmorata sp. n.

Allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, le troisième article un peu plus long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux de moitié plus longs que les joues. Pronotum aussi long que large, légèrement arrondi sur les côtés. Elytres arrondis à l'apex, peu densément et très finement ponctués dans la moitié antérieure.

Rouge; toute la surface densément marbrée de fine pubescence jaune pâle.

Long.: 4 mm; larg.: 1,5 mm.

Type du Mont Rembai, 19-21 I 1977, Leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis nigrovitticollis sp. n.

Allongé. Antennes un peu plus longues que le corps, le troisième article aussi long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues. Pronotum aussi long que large, pourvu de deux dépressions transversales, une antérieure et une postérieure, légèrement arrondi sur les côtés entre ces dépressions. Elytres longs, impondués, arrondis à l'apex.

Brun foncé, couvert de pubescence brun rougeâtre. De chaque côté du milieu du disque du pronotum une courte bande longitudinale courbée noire (concave vers le milieu). Elytres vaguement marbrés de brun un peu plus foncé. Les pattes et les 4 premiers articles antennaires rouges, les tibias annelées de jaune pâle après la base et à l'apex, plutôt brun foncé sur le restant de leur moitié apicale. Les articles antennaires 5 à 11 à pubescence brune et annelés de jaune pâle à la base.

Long.: 3,5 mm; larg.: 1,25 mm.

Type de Bourail, 26-27 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis postmaculata sp. n.

Allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, le troisième article aussi long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux sensiblement plus longs que les joues. Pronotum aussi long que large, arrondi sur les côtés. Elytres arrondis à l'apex, très finement ponctués sur un peu plus du tiers basilaire.

Brun foncé, la surface très éparsément marbrée de blanchâtre. Sur chaque élytre une grande tache allongée triangulaire ochracée préapicale à la suture qui devient beaucoup plus courte en direction du bord latéral. L'extrême base des articles antennaires 5 à 11 à pubescence blanchâtre.

Long.: 4 mm; larg.: 1,5 mm.

Type de Hienghène, 29 I 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Un Paratype idem. Un Paratype de Caavatch, 5 II 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis fuscolateralis sp. n.

Allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, le troisième article aussi long que le quatrième. Lobes inférieurs des yeux un peu plus longs que les joues. Pronotum un peu plus large que long, assez fortement arrondi au milieu du bord latéral. Elytres impondués, arrondis à l'apex.

Brun rougeâtre foncé, couvert en majeure partie de pubescence jaune paille. Le pronotum orné d'une large bande longitudinale médiane dénudée. Sur chaque élytre une longue

tache latérale médiane brun foncé qui s'amincit vers l'avant au bord latéral. Articles antennaires 4 à 11 bruns à base jaunâtre.

Long. : 3 mm; larg. : 1 mm.

Type du Col d'Amieu, 19 I 1977, leg. Dr. J. Balogh. - Un Paratype du Mont Panié, 7 II 1977. Deux Paratypes du Mont Rembai, 19-21 I 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Stenellipsis assimilis sp. n.

Proche de fuscolateralis Breun., mais le troisième article des antennes un peu moins long que le quatrième, le pronotum aussi long que large, moins arrondi sur les côtés, les élytres très finement ponctués au quart basilaire, le pronotum sans bande médiane dénudée.

Type de l'Ile Lifou: Chépénélé, 20 II 1977, leg. Dr. J. Balogh.

Adresse de l'auteur: Dr. S. von BREUNING
7, rue Durantin

F-75018 Paris XVIII.
France

